

河北桑属二新变种

武玉壁 张进献 庞玉兰

(河北省农林科学院蚕桑研究所, 承德 067000)

TWO NEW VARIETY OF MORUS FROM HEBEI

WU Yu-Bi, ZHANG Jin-Xian, PANG Yu-Lan

(Institute of Silkworm & Mulberry Research, Hebei Academy of Agriculture & Forestry Sciences,
Chengde 067000)

关键词 桑属, 圆叶蒙桑, 裂叶桑

Key words *Morus*, *M. mongolica* var. *rotundifolia*, *M. alba* var. *biloba*

1. 圆叶蒙桑 新变种

Morus mongolica (Bur.) Schneid. var. *rotundifolia* Wu Yu-Bi, var. nov.

A var. *mongolica* differt foliis orbicularibus, apice retundatis.

河北(Hebei): 兴隆县(Xinglong Xian), 雾灵山(Wuling Mountain), 石门台(Shimentai). alt. 800m, habitat: on mountain slope, 10 June 1989, Wu Yu-Bi 01 (holotype in PE).

本变种与原变种的区别是: 叶近圆形, 顶端圆, 不具尾尖。

2. 裂叶桑 新变种

Morus alba var. *emargenata* Wu Yu-Bi, var. nov.

A varietate typica differt foliis apice rotundato-obtusis, saepe 2-lobulatis vel indivisis, margine crenatis, crenis apice apiculatis.

河北(Hebei): 宽城县(Kuancheng Xian), 尖宝山(Jianbao Mountain). alt. 600m, habitat: in forest, 15 June 1989, Wu Yu-Bi 03 (Holotype in PE).

本变种与原变种的区别为: 叶顶端圆钝, 常 2 裂或不裂, 叶缘锯齿具小尖头。

致谢 承蒙中国科学院植物研究所曹子余先生审阅全文。